

# ALI SE ZAVEDAMO NEVARNOSTI SRČNO-ŽILNE BOLEZNI PRI SLADKORNI BOLEZNI TIPA 2? NE, ŠE NE. A JE ČAS, DA SE JE ZAVEMO.

## DEJSTVO

Srčno-žilna bolezen je najpogostejši vzrok za smrt ali prizadetost pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 (SB2).



**425**

**milijonov ljudi** na svetu ima SB2.



**2 do 6-krat**

večjo verjetnost za **smrt** zaradi srčne in možganske kapi ima človek s SB 2 v primerjavi s človekom, ki te bolezni nima.



**629**

**milijonov ljudi** bo – po napovedi IDF – do leta 2045 imelo SB2.

## INFO

Mednarodno združenje za sladkorno bolezen (IDF) je letos objavilo rezultate globalne ankete o ozaveščenosti ljudi s SB2 o nevarnosti srčno-žilne bolezni.

**12.695**

ljudi s SB2 je odgovorilo na **anketna vprašanja**.



## KLJUČNI REZULTATI

**2 od 3**

sodelujočih ima **tveganje** za srčno-žilno bolezen in/ali so že imeli srčno-žilni dogodek.



**1 od 4**

sodelujočih še nikoli ni govoril o **dejavnikih** za srčno-žilno tveganje z zdravnikom.



**1 od 4**

sodelujočih ocenjuje, da ima **nizko tveganje** za srčno-žilno bolezen.

**3 od 4**

sodelujočih se zanaša, da bodo informacijo o srčno-žilni bolezni dobili od zdravnika.



## POMEMBNO!

- Udeleženci raziskave pri svoji bolezni, SB2, podcenjujejo tveganje za srčno-žilno bolezen.
- Informacije in nasvete o srčno-žilni bolezni udeleženci raziskave poiščejo pri zdravniku.



- V nekaterih primerih med zdravnikom in človekom s SB2 o srčno-žilnih tveganjih ni zadostne komunikacije.
- Izboljšati moramo ozaveščenost nevarnosti srčno-žilne bolezni pri ljudeh s SB2 za njihove boljše izide zdravljenja in kakovost življenja.